

Abouriou N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad de cepa es probablemente originaria de Lot y Garona (alrededor de Villeréal). Fue identificada a finales del siglo XIX por Numa Naugé.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Abouriou

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Abouriou está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados con una distribución de la pigmentación antociánica en ribete,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos con senos laterales bastante profundos, un seno peciolar abierto en lira, dientes de largo medio, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado que presenta hinchazón, y en el envés del limbo, una baja densidad de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	908	898	369	539	488	474	319

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	247	178	194	252	240	233	239
Allele 2	149	234	247	182	204	260	248	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Por su precocidad, su fertilidad (posibilidad de podar corta) y su vigor moderado, esta cepa muestra una buena adaptación a las condiciones difíciles, marginales y límites a nivel climático.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Abouriou llevan los números 603 y 604. En 2006, se llevó a cabo una plantación de unos cincuenta clones para fines de conservación en Lot y Garona.

Potencial tecnológico

Los racimos son de tamaño mediano, al igual que las bayas. Esta variedad de uva produce unos vinos con mucho color, vigorosos, bastante tánicos, pero faltarle a acidez.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Abouriou es relativamente poco sensible a las enfermedades y resiste bastante bien la podredumbre gris.


Fenología

época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas. época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier