

Franc noir de la Haute-Saône N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad originaria del este de Francia sería el resultado, según los análisis genéticos publicados, de un cruce entre el Pinot noir y el Gouais blanc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Franc noir de la Haute-Saône

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Franc noir de la Haute-Saône está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas de gran tamaño, orbiculares, enteras, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales con fondo en U, un seno peciolar cerrado de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos respecto a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, un limbo alabeado, con bordes hacia el envés, ondulado entre los nervios cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	2018
ha	5	0.1

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	225	243	176	188	238	238	216	239
Allele 2	141	232	249	186	204	246	254	227	271

Potencial tecnológico

vinos de calidad adecuada.

la podredumbre gris.

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El

Franc noir de la Haute-Saône permite elaborar unos

El Franc noir de la Haute-Saône es bastante sensible

al mildiu. Por el contrario, no es demasiado sensible a

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Cultivo y habilidades agronómicas

El Franc noir de la Haute-Saône es una variedad precoz, vigorosa, fértil y regular.

Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Franc noir de la Haute-Saône lleva el número 1226. Recientemente, se han llevado a cabo unas prospecciones en el noreste.

Fenología


Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, media semana a 1 semana después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier