Fuella nera N

Variedad de uva de vino.

Origen

Esta variedad se cultiva en Alpes Marítimos, en los alrededores de Niza.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Fuella nera

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, la Fuella nera está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de gran tamaño, cuneiformes a pentagonales, de cinco lóbulos, con un lóbulo central alargado, un seno peciolar de lóbulos muy superpuestos y un diente bastante frecuente en el borde, dientes cortos respecto a su ancho en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo mate, alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	2000	2008	2018
ha	14	10	8	16	22

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	239	178	186	248	240	233	251
Allele 2	143	238	243	186	188	260	254	243	255

Cultivo y habilidades agronómicas

La Fuella nera es una cepa vigorosa, adaptada a la sequía. Debe podarse en corto e implantarse en unos terrenos bien expuestos.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de la Fuella nera llevan los números 1073 y 1074. Estos dos clones son originarios de los viñedos de Bellet (Alpes Marítimos).

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes, mientras que las bayas son pequeñas. La Fuella nera permite elaborar vinos vigoros, con un color óptimo, bastante finos y aromáticos, pero de baja acidez.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Fuella nera se muestra sensible al oídio y a la podredumbre gris.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados