

# Gouget N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad encuentra su origen en los viñedos del centro de Francia, probablemente en la región de Montluçon. Según los análisis genéticos publicados, el Gouget es probablemente un descendiente del Gouais blanc.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Gouget

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Gouget está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar abierto, en V, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	739	518	13	4	16	13	8.4
----	-----	-----	----	---	----	----	-----

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	239	176	194	238	238	227	251
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	232	257	191	196	252	248	233	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad vigorosa, de porte erguido suele podarse en largo. Su rendimiento en fruta suele ser óptimo tras una helada de primavera.

### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. Esta variedad produce vinos relativamente ácidos, de bajo grado alcohólico, color deficiente y poco tánicos.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Gouget es muy sensible a la podredumbre gris.

### Fenología


Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
  - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

---



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*