Grenache gris G

Variedad de uva de vino.

Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación gris del Grenache.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Grenache gris

Sinonimia

En España, el Grenache gris es oficialmente denominado "Garnacha roja". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Grenache gris está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de España.

Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la del Grenache, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es gris.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	8652	9362	16286	12083	2926	1683	1754

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	191	188	258	240	243	239
Allele 2	143	238	243	191	188	258	254	243	249

Cultivo y habilidades agronómicas

Las cualidades son similares a las de otros tipos de Grenache, pero parece ser un poco más productiva que el Grenache blanc.

Selección clonal en Francia

Los cinco clones de garnacha gris autorizados son los números 147, 148, 1390, 1391 y 1392.

Recientemente, se han llevado a cabo unas prospecciones en el viñedo de Banyuls (Pirineos Orientales).

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas son pequeñas a medianas. El Grenache gris se utiliza principalmente para la elaboración de vinos dulces naturales y participa en la producción de vinos grises (en las arenas del litoral mediterráneo).

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La sensibilidad y la resistencia a las enfermedades son comparables a las del Grenache blanc, pero con una sensibilidad más marcada a la podredumbre gris.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados