

Joubertin N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Isère. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, el Joubertin sería el resultado de un cruce entre el Persan y el Peloursin.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Joubertin

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Joubertin está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, orbiculares, de siete o nueve lóbulos con un seno peciolar poco abierto o con lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el envés, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2018
ha	172	158	8	2	0.4

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	229	257	182	188	240	240	233	249
Allele 2	149	236	257	186	194	248	262	235	251

Cultivo y habilidades agronómicas

El Joubertin es una variedad moderadamente fértil. Se puede manejar en poda larga o corta y tiene tendencia a producir muchos chupones y esperguras de la parte subterránea. Esta variedad se adapta bien a los terrenos arcillosos y relativamente compactos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Joubertin Ileva el número 1320.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El Joubertin permite elaborar vinos con gran color, robustos, pero de baja acidez. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es limitado.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Joubertin no presenta una sensibilidad particular a las principales enfermedades.


Fenología

época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas. época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier