

Durif N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad, procedente del cruce entre la Syrah y el Peloursin, fue desarrollada por M. Durif.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Durif

Sinonimia

En Portugal, el Durif es oficialmente denominado "Mondet". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Durif está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo o verde,
- a los pámpanos, en ocasiones estriados en el extremo,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos con senos laterales muy profundos, abiertos con fondos redondeados, un seno peciolar en U abierto, dientes pequeños, de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo verde oscuro, con ligera hinchazón, en ocasiones plisado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada y elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2018
ha	530	359	9	5.9

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	239	176	194	252	240	227	239
Allele 2	149	229	251	188	200	252	248	235	251

Cultivo y habilidades agronómicas

El Durif es una variedad de vigor bajo a moderado, con un porte semi-erguido u horizontal. Bastante fértil, puede manejarse en poda corta. Las bayas son sensibles a los golpes de sol y al marchitamiento. Esta variedad es también bastante sensible a las heladas de invierno.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Durif lleva el número 1130.

Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas del Durif son de tamaño mediano. El potencial de azúcar de esta variedad es medio y permite elaborar unos vinos con color, bastante tánicos y astringentes, pero poco afrutados.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Durif es sensible a las enfermedades de madera, a la podredumbre gris y al black-rot, pero tolera el mildiu.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*