

Furmint B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria de Hungría. Según los análisis genéticos publicados, el Furmint es probablemente sería el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Alba imputotato.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Furmint

Sinonimia

En la Unión Europea, el Furmint es oficialmente denominado con otros nombres: Moslavac (Croacia), Kéknyelü (Hungría) y Sipon (Eslovenia). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Furmint está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia,

Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Rumanía.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas cuneiformes u orbiculo-reniformes, enteras o de tres lóbulos con senos laterales poco profundos, un seno peciolar abierto en U o con lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos respecto a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos o con un lado convexo y uno cóncavo, netamente mucronadas, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo grueso, con bordes hacia el haz, con hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	2018
ha	21	0.2

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	238	238	227	263
Allele 2	151	238	249	191	204	250	240	247	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Furmint es una variedad de vigor medio a elevado con un porte erguido. Debe manejarse en poda corta. En ocasiones, es sensible al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Furmint lleva el número 1149.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Furmint son pequeños, pero las bayas son grandes. El potencial en azúcares de esta variedad es medio. Permite elaborar unos vinos blancos secos, robustos, potentes, con una acidez elevada. Cuando se vendimia tras una pasificación o en presencia de podredumbre noble, puede producir unos grandes vinos licorosos.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Furmint es sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier