

Ignea Rs

Variedad de uva de mesa.







Origen

La Ignea o 185 Pirovano fue obtenida por Angelo Pirovano (Italia) mediante el cruce entre el 46 a Pirovano y el 2 Pirovano.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Ignea

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Ignea está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, enteras, con un seno peciolar con fondo en V, abierto, dientes pequeños, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con hinchazón fina, con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y una densidad nula o muy baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2018 ha 0

Perfil genético

| MicrosatelliteVVS2 | | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|--------------------|-----|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 229 | 247 | 182 | 192 | 240 | 248 | 233 | 239 |
| Allele 2 | 141 | 234 | 251 | 191 | 204 | 258 | 254 | 243 | 263 |

Cultivo y habilidades agronómicas

La Ignea es una variedad de vigor bajo a medio.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Ignea lleva el número 1388.

Fenología

Época de desborre: 10 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes, poco compactos y las bayas son medianas a grandes, con piel gruesa y pulpa carnosa de sabor simple. La Ignea presenta una aptitud óptima para la conservación y el transporte.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Ignea es bastante sensible a la podredumbre gris, al oídio y al mildiu.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier