

# Madeleine de Clermont B

Variedad de uva de mesa.



## Origen

Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería el resultado de un cruce entre la Madeleine angevine y el Chasselas.

## Usar

Variedad de uva de mesa.

## Nombre de la variedad en Francia

Madeleine de Clermont

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, la Madeleine de Clermont está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, cerrado o con unos lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos a medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación nula de los nervios, un limbo con hinchazón intensa, alabeado, ocasionalmente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2008	2018
ha	7	0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	234	247	182	194	250	240	243	239
Allele 2	153	238	247	191	204	252	240	267	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

La Madeleine de Clermont es una variedad precoz, moderadamente vigorosa, de porte semi-erguido y que se puede manejar en poda corta.

### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y compactos. Las bayas también son medianas, con una piel poco gruesa y una pulpa de sabor simple.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Madeleine de Clermont lleva el número 1373.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


La Madeleine de Clermont es poco sensible a la podredumbre gris.

### Fenología


Época de desborre: 4 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: precoz, 1 semana y media semanas antes de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*