

# **Aramon N**

# Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad del Languedoc es, según los análisis genéticos publicados, probablemente una descendiente del Gouais blanc y del Ouliven.

### Usar

Variedad de uva de vino.

#### Nombre de la variedad en Francia

Aramon

#### Sinonimia

En Portugal, el Aramon es oficialmente denominado "Amor não me deixes". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Aramon está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Chipre y Portugal.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad de pelos tumbados elevada o muy elevada con una distribución de la pigmentación antociánica en ribete,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceads,
- a las hojas adultas de tres lóbulos, con un seno peciolar en V abierto, dientes pequeños, largos respecto a la anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y uno convexo, un limbo con bordes hacia el haz,
- a las bayas que tienen forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	150230	124052	63487	34666	11943	4429	1141

# Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	239	178	188	240	240	227	249
Allele 2	141	232	243	191	196	260	254	259	249

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Aramon es una variedad muy fértil, de vigor reducido y porte rastrero. Debe manejarse en poda corta. En climas cálidos y terrenos excesivamente fértiles, tiene incluso la tendencia a secarse. Es sensible al escaldado.

### Selección clonal en Francia

Los cinco clones autorizados de Aramon Ilevan los números 204, 323, 324, 325 y 401. Un conservatorio con casi 80 clones se plantó en 1997 en el departamento de Aude.

### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas muy grandes. Esta variedad muy productiva produce generalmente unos vinos con tipicidad limitada y carentes de color. El potencial de acumulación de azúcares en las bayas es reducido.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Aramon es poco sensible al oídio, pero no tolera bien el mildiu y la excoriosis. También es bastante sensible a los ácaros.

# Fenología


Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

#### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier