

Madina B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1964 por el INRA mediante el cruce entre la Cardinal y la Sultanine.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Madina

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Madina está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas verde claro, orbiculares o cuneiformes, enteras, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar con fondo en V, poco abierto o cerrado, dientes medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula o muy baja de los nervios, un limbo liso, ligeramente alabeado, abultado a lo largo de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	223	239	176	186	248	248	243	249
Allele 2	149	232	249	191	188	252	254	243	251

Cultivo y habilidades agronómicas

La Madina posee un vigor elevado. Debe ser empalizada y manejarse en poda larga pues su fertilidad es moderada. Ocasionalmente, las bayas pueden sufrir ruptura en caso de lluvia al final del proceso de maduración.

Potencial tecnológico

Los racimos de la Madina son medianos y poco compactos. Las bayas son apirenas, pequeñas a medianas, doradas, con una piel bastante gruesa y una pulpa jugosa, de sabor simple. La Madina presenta una aptitud óptima para la conservación y el transporte.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Madina lleva el número 970.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Madina es poco sensible a la podredumbre.


Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*