


Manseng noir N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de los Pirineos occidentales.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Manseng noir

Sinonimia

En la Unión Europea, el Manseng noir es oficialmente denominado con otros nombres: Ferron (España) y Espadeiron Mole (Portugal). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Manseng noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de España y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color rojizo, con zonas muy bronceadas,
- a las hojas adultas verde oscuro, orbiculares o cuneiformes, enteras o de tres lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar abierto, en U, en ocasiones con el fondo limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes cortos a medianos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés, con hinchazón, abultado u ondulado entre los nervios cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1998	2008	2018
ha	790	636	8	4	3	34

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	239	186	194	252	240	233	239
Allele 2	153	238	249	186	200	252	254	267	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Manseng noir es una variedad vigorosa, poco fértil en las yemas de la base y que debe manejarse en poda larga. No obstante, si se maneja incorrectamente, puede producir rendimientos elevados. Se adapta bien a todo tipo de suelos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Manseng noir lleva el número 897. En 2013 se implantó en los Pirineos Atlánticos un conservatorio de unos treinta clones.

Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes, poco compactos, y las bayas son de tamaño pequeño a mediano. El Manseng noir permite elaborar vinos de color intenso y excelente capa. Son vinos astringentes, un poco ácidos y con potencial de guarda, que resultan interesantes para ensamblajes.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad no parece presentar especial sensibilidad a enfermedades y plagas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*