

Marselan N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA en 1961 y es el resultado de un cruce entre el Cabernet-Sauvignon y el Grenache.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Marselan

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Marselan está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Croacia, España, Italia y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color verde,
- las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas verde oscuro, brillantes, orbiculares, de cinco, siete o nueve lóbulos, con un seno peciolar poco abierto en U o lóbulos ligeramente superpuestos, de dientes cortos o medianos de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antocianina nula o baja de los nervios, un limbo alabeado, liso y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	2000	2008	2018
ha	468	1356	5922

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	239	186	188	248	238	233	239
Allele 2	143	229	243	191	194	258	240	243	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Marselan es una variedad bastante fértil que se puede manejar en poda corta (sobre cordones). Su manejo debe realizarse preferiblemente con suficientes tutores pues genera pámpanos bastante largos. Es preferible no plantarlo en suelos demasiado superficiales. Hay que evitar injertarlo sobre el 140 Ru.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Marselan lleva el número 980.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son grandes, mientras que las bayas son muy pequeñas con gran cantidad de pruina. Por este motivo, el rendimiento en mosto es limitado (aproximadamente 160 kg/hL). El Marselan permite elaborar vinos con buen color, con tipicidad óptima y gran calidad. Son aromáticos, robustos, dotados de una estructura muy interesante (taninos suaves sin amargor), que los hace aptos para la crianza.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Marselan es muy poco sensible a la podredumbre gris y poco sensible al oídio y a los ácaros. También es susceptible a las agallas de la filoxera y al mildiu sobre las hojas jóvenes.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*