

Mérille N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria del sudoeste (Tarn y Garona).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Mérille

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, la Mérille está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- al pámpano con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, de tres o cinco lóbulos, con una pigmentación antocianica media a elevada de los nervios, un limbo con hinchazón marcada, plisado cerca del peciolo, ondulado entre los nervios principales, con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	2422	2458	622	226	105	80	24

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	141	232	239	182	194	240	248	235	239
Allele 2	149	236	247	188	194	260	254	243	251

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad garantiza una producción regular y, en poda larga, el rendimiento es elevado.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Mérille llevan los números 444, 445 y 790.

Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son muy grandes y las bayas grandes. La Mérille permite obtener vinos ligeros (bajo potencial en azúcares) y bastante vulgares.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad se muestra poco sensible al mildiu y al oídio. Es un poco sensible a la podredumbre gris y un poco más sensible a los ácaros, las polillas del racimo y los cicadélidos.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*