

Merlot blanc B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad se ha desarrollado en los viñedos bordeleses. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, el Merlot blanc sería el resultado de un cruce entre la Folle blanche y el Merlot.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Merlot blanc

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Merlot blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar abierto con forma de la base en U, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	5275	3662	1905	766	116	71	24
----	------	------	------	-----	-----	----	----

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	223	239	186	194	252	248	227	239
Allele 2	149	234	247	188	196	260	248	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Merlot blanc es una variedad muy fértil, productiva y regular. Es sensible a la sequía.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Merlot blanc lleva el número 1182.

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas pequeñas. El Merlot blanc produce vinos relativamente neutros y de calidad media.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Merlot blanc es muy sensible a la podredumbre gris. En pie franco en suelos arenosos, suele sufrir de manera significativa el ataque de los nemátodos *Meloidogyne*.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*