Meslier Saint-François B

Variedad de uva de vino y para aguardiente.







Origen

Esta variedad originaria del oeste de Francia sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Chenin.

Usar

Variedad de uva de vino y para aguardiente.

Nombre de la variedad en Francia

Meslier Saint-François

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Gros Meslier" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Meslier Saint-François está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a los pámpanos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, de color verde oscuro, enteras o de cinco lóbulos con senos laterales poco profundos con fondo en U, un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes de lados convexos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo verde oscuro, grueso, con bordes ligeramente hacia el haz y alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	2336	1851	589	221	60	30	8

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	239	172	188	238	238	227	271
Allele 2	131	232	239	176	196	248	240	233	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad de desborre precoz no tolera bien las heladas de primavera. El Meslier Saint-François es una variedad de vigor reducido a moderado, pero fértil.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Meslier Saint-François lleva el número 1325.

Fenología

época de desborre: 3 días antes de la variedad Chasselas.
época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. Esta variedad produce vinos de bajo grado alcohólico, bastante planos y ligeros. Los aguardientes obtenidos a partir de sus vinos son finos y tienen buqué.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es poco sensible al black rot y al mildiu. Por el contrario, se muestra bastante sensible al oídio y muy sensible a la podredumbre ácida.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados