

Meunier N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es una mutación del Pinot relativa, en particular, a la vellosidad.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Meunier

Sinonimia

En la Unión Europea, el Meunier es oficialmente denominado con otros nombres: Mlynarka (Rep. Checa), Müllerrebe (Alemania), Pinot Meunier (Bélgica, España, Rep. Checa) y Schwarzriesling (Austria). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Meunier está inscrito oficialmente en el «[Catalogue des variétés de vigne](#)» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Italia, Países Bajos y República Checa.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- al pámpano con entrenudos de rayas rojas o de color rojo con una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos con senos laterales profundos con un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar poco abierto, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo que, en el haz, presenta una densidad baja a media de pelos tumbados y, en el envés, una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	5603	7739	10572	11115	10961	10737	12054

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	126	225	239	182	188	240	238	216	239
Allele 2	135	236	243	186	194	246	248	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad bastante productiva tolera bien las heladas de invierno. Su rendimiento en fruta suele ser bastante óptimo tras una helada de primavera. Tiene tendencia a producir muchos chupones y esperguras de la parte subterránea. El Meunier se adapta bien a terrenos calcáreos y se muestra poco sensible a la clorosis.

Selección clonal en Francia


Los catorce clones autorizados de Meunier llevan los números 458, 791, 817, 818, 864, 865, 900, 901, 916, 924, 925, 977, 978 y 983. En 1984 se instaló en Alsacia un conservatorio de casi 30 clones. Un otro conservatorio de 94 clones fue instalado en los viñedos de Champaña en 1995.

Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, media semana después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas muy pequeñas. Esta variedad se utiliza, sobre todo, para la elaboración de vinos espumosos. Permite obtener vinos moderadamente ácidos, que evolucionan con bastante rapidez.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Meunier es poco sensible a la excoriosis, al oídio y al mildiu. Por el contrario, se muestra sensible a las polillas del racimo y a la podredumbre gris.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*