


# Mireille B

# Variedad de uva de mesa.







### Origen

Esta variedad fue obtenida por H. Agnel mediante el cruce entre el Italia y la Perle de Csaba.

### Usar

Variedad de uva de mesa.

### Nombre de la variedad en Francia

Mireille

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### **Datos regulatorios**

En Francia, la Mireille está oficialmente inscrita en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

# Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes bronceadas o verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar abierto o poco abierto, con fondo en U, dientes medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja a media de los nervios, un limbo brillante, ligeramente alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica y sabor a moscatel.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2018
ha 0

# Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	243	176	204	256	238	233	271
Allele 2	131	234	247	178	204	260	240	267	271

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas son pequeñas

a medianas, con una pulpa carnosa y un sabor

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

agradable. Pueden adoptar un color ambarino al madurar y se marchitan rápidamente tras la vendimia.

La Mireille es poco sensible a la podredumbre gris.

### Cultivo y habilidades agronómicas

La Mireille es una variedad de vigor medio con un porte semi-erguido u horizontal. Debe ser empalizada y manejarse en poda corta o poda larga moderada.

### Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Mireille lleva el número 599.

### Fenología


Época de desborre: 8 días antes de la variedad Chasselas. Época de maduración: precoz, 3 semanas antes de la variedad Chasselas.

### . . . .

## Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia. ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier