

Mireille B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad fue obtenida por H. Agnel mediante el cruce entre el Italia y la Perle de Csaba.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Mireille

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Mireille está oficialmente inscrita en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes bronceadas o verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar abierto o poco abierto, con fondo en U, dientes medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo brillante, ligeramente alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica y sabor a moscatel.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	243	176	204	256	238	233	271
Allele 2	131	234	247	178	204	260	240	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

La Mireille es una variedad de vigor medio con un porte semi-erguido u horizontal. Debe ser empalizada y manejarse en poda corta o poda larga moderada.


Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Mireille lleva el número 599.

Fenología

Época de desborre: 6 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: precoz, 3 semanas antes de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas son pequeñas a medianas, con una pulpa carnosa y un sabor agradable. Pueden adoptar un color ambarino al madurar y se marchitan rápidamente tras la vendimia.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Mireille es poco sensible a la podredumbre gris.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*