Arbane B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad del noreste de Francia parece ser originaria del departamento de Aube.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Arbane

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Arbane está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad mediana a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de pequeño tamaño, de cinco o siete lóbulos con un seno peciolar abierto, en U, una pigmentación antociánica reducida de los nervios, un limbo liso, brillante, ligeramente plisado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas con forma redondeada o elíptica corta.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2018
ha	2	4	2	6.7

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	188	240	240	235	251
Allele 2	141	236	257	182	194	260	254	253	255

Cultivo y habilidades agronómicas

La Arbane es una variedad vigorosa y con un ciclo vegetativo largo: época de desborre precoz y madurez bastante tardía. En la región septentrional, esta variedad debe reservarse a los terrenos que gocen de la mejor exposición. La Arbane produce unos rendimientos muy limitados.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Arbane lleva el número 1178. Recientemente, se han llevado a cabo unas prospecciones en los viñedos del noreste. Un conservatorio de veinte y quatro clones fue plantado en Champaña en 2003.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño muy reducido. El Arbane permite elaborar vinos blancos secos, nerviosos, con gran buqué y de calidad. El potencial de acumulación de los azúcares de esta variedad es elevado, al tiempo que conserva una acidez correcta.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es bastante sensible a las enfermedades, en particular, el mildiu.

Fenología


Época de desborre: como la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados