

Mondeuse N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Saboya. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, la Mondeuse sería el resultado de un cruce entre la Mondeuse blanche y el Tressot.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Mondeuse

Sinonimia

En Portugal, la Mondeuse es oficialmente denominada "Rodo". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, la Mondeuse está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas pentagonales, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o cerrado, un lóbulo central alargado, dientes cortos, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con hinchazón leve, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1066	930	194	173	237	288	298

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	186	194	246	238	216	239
Allele 2	137	229	260	186	194	260	240	216	239

Cultivo y habilidades agronómicas

La Mondeuse es una variedad de vigor óptimo, que debe manejarse en poda corta. Además, la Mondeuse es sensible a la clorosis y a la sequía. De forma generalizada, se adapta bastante bien a los cantizales arcilloso-calcáreos y pedregosos en ladera.

Selección clonal en Francia

Los quatro clones autorizados de Mondeuse llevan los números 368, 822, 926 y 1326.

Un conservatorio de una veintena de clones fue plantado en Saboya entre 2014 y 2015.

Fenología

época de desborre: como la variedad Chasselas.

época de maduración: $2^{\underline{a}}$ época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Princt Nort Grenache Syrah Cresselles -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano. La Mondeuse permite elaborar vinos de gran tipicidad, tánicos, con buen color, bien provistos de aromas y aptos para el envejecimiento. El potencial en azúcares de esta variedad es medio con una acidez buena.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Mondeuse es poco sensible a la podredumbre gris y a la excoriosis. Por el contrario, es sensible a los ácaros, al oídio y al mildiu.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier