


# Monerac N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad, obtenida por el INRA en 1958, es el resultado de un cruce entre el Grenache y el Aramon.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Monerac

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Monerac está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- al pámpano con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	1988	1998	2008	2018
ha	2	2	3	1.9

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	178	188	244	240	227	239
Allele 2	141	232	239	191	196	258	254	243	249

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad vigorosa, de porte semi-erguido, debe podarse en corto. Se puede manejar en gobelet o ser empalizada. Su producción es regular.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Monerac lleva el número 536.

### Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 3ª época, 5 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son mediados a grandes. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es relativamente elevado. Los vinos son poco astringentes, pero carentes de color en ocasiones. El Monerac se adapta bien a la producción de vinos rosados.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Monerac es poco sensible a la podredumbre gris, pues sus racimos son bastante abiertos.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*