

Mourvaison N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Mourvaison es una variedad provenzal. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Aubun y el Pougayen.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Mourvaison

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Mourvaison está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de tamaño mediano a grande, orbiculares, enteras, con un seno peciolar poco abierto con forma de la base en U, dientes pequeños a medianos y con un largo medio en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja a media de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	118	117	22	8	4	4	2.7

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	239	176	186	252	248	243	239
Allele 2	141	229	257	191	194	256	266	247	261

Cultivo y habilidades agronómicas

El Mourvaison es una variedad vigorosa, tardía, que debe manejarse en poda corta y plantarse en terrenos cálidos y bien expuestos. Algunas bayas tienden a permanecer verdes.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El Mourvaison produce vinos tánicos, ácidos y carentes de finura.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Mourvaison lleva el número 1171. Recientemente, se han llevado a cabo unas prospecciones en el viñedo provenzal.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Mourvaison no presenta sensibilidad particular a las enfermedades criptogámicas.


Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*