Mourvèdre N

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad, de origen español, se introdujo en Francia probablemente hacia finales de la Edad Media.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Mourvèdre

Sinonimia

En la Unión Europea, el Mourvèdre es oficialmente denominado con otros nombres: Mataro (Chipre) y Monastrell (España). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Mourvèdre está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Chipre, Croacia, España, Grecia y Malta.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- al pámpano de porte erguido y con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas de forma orbicular, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar en lira abierto, dientes grandes, medianos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo plano y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	617	857	3146	5608	7249	9164	9149

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	176	188	252	240	243	239
Allele 2	149	238	249	186	204	262	262	257	255

Cultivo y habilidades agronómicas

El Mourvèdre es una variedad exigente y de cultivo delicado. Por su porte erguido y su carácter acrótono, debe manejarse en poda corta. También se puede manejar en cordones, con un empalizamiento reducido, o en gobelet con la apertura suficiente. Debemos velar por la conservación del follaje, que es poco abundante y de eficacia moderada. Deben evitarse los cercenados para limitar la aparición de rebuscos de gran tamaño, que se convierten en una competencia perjudicial. La producción por cepa debe ser baja para evitar los riesgos de agotamiento. En ocasiones, esta variedad presenta fenómenos de alternancia en lo que respecta a la fertilidad. Las exigencias pedoclimáticas del Mourvèdre son limitantes. Se adapta bien a los suelos calcáreos con profundidad suficiente para permitir una alimentación hídrica limitada, pero regular. La complementación nutricional con potasio y magnesio (K/Mg) debe también ser equilibrada para evitar la aparición de carencias. Por último, un factor limitante principal para el cultivo de esta variedad de ciclo tardío (desborre y maduración): las temperaturas en el momento de la maduración deben ser elevadas (en particular, las temperaturas mínimas) a fin de permitir un desarrollo óptimo de la maduración y una acumulación suficiente de azúcares en las bayas. Por tanto, esta variedad debe reservarse a las zonas meridionales más cálidas y con mejor exposición.

Selección clonal en Francia

Los catorce clones autorizados de Mourvèdre llevan los números 233, 234, 244, 245, 247, 248, 249, 369, 448, 449, 450, 520, 1069 y 1215. Desde 2004, se instaló un conservatorio de más de 100 clones en los viñedos de Bandol (Var) desde 2004.

Fenología

Potencial tecnológico

Los racimos de Mourvèdre son medianos a grandes y las bayas son de tamaño medio. El potencial de color de esta variedad es medio y, en ocasiones, carece de acidez. No obstante, el Mourvèdre permite obtener vinos de calidad excepcional, aromáticos, tánicos y estructurados, aptos para el envejecimiento y la crianza en madera a condición de que el grado de maduración sea suficiente (12 grados naturales como mínimo) y de que la producción por cepa sea limitada.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Mourvèdre es sensible a los ácaros, a los cicadélidos, a la yesca y a la podredumbre ácida. Por el contrario, suele ser poco sensible a la podredumbre gris y tolera bien la excoriosis.


©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Época de desborre: 14 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados