

Muscardin N

Variedad de uva de vino.







Origen

El Muscardin es una variedad autóctona de Côtes du Rhône.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Muscardin

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Muscardin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas grandes, de tres lóbulos, con un seno peciolar cerrado o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con hinchazón marcada, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad nula o baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2000	2008	2018
ha	1	25	10	17	16	16

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	250	240	235	239
Allele 2	131	229	249	182	202	252	248	259	251

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad de pámpanos largos precisa un manejo con tutores en número suficiente.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Muscardin lleva el número 1101. Es el fruto de las prospecciones realizadas en Côtes du Rhône. En 2001, se plantó una veintena de clones en un conservatorio en Côtes du Rhône.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El Muscardin posee un potencial en azúcares bastante bajo o medio. Permite obtener vinos relativamente ácidos y de color deficiente con una buena finura.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Muscardin es un poco sensible a la podredumbre gris pero es sensible a la yesca.

Fenología


Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier