

Muscat Ottonel B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida por M. Moreau-Robert en el siglo XIX. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Chasselas y el Muscat d'Eisenstadt.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Muscat Ottonel

Sinonimia

En la Unión Europea, el Muscat Ottonel es oficialmente denominado con otros nombres: Moschato Samou (Chipre) y Ottonel muskotály (Hungría). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Muscat Ottonel está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bulgaria,

Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Hungría, Luxemburgo, República Checa y Rumanía.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes rojizas,
- al pámpano con zarcillos largos y entrenudos con estrías rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes de lados convexos cortos o medianos en relación a su anchura en la base, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano, liso, con una densidad baja a media de pelos erguidos en los nervios del haz del limbo y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada y con sabor a moscatel.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	192	446	429	158	162	158

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	256	248	257	239
Allele 2	141	225	243	186	194	260	254	267	263

Cultivo y habilidades agronómicas

El Muscat Ottonel es una variedad precoz, débil, de porte horizontal. Poco sensible a la clorosis, se adapta bien a los suelos arcilloso-calcáreos. Por el contrario, se muestra sensible a la corredura.

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas son medianas a grandes. Esta variedad posee un buen potencial en azúcares y permite elaborar vinos secos o licorosos aromáticos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Muscat Ottonel lleva el número 59.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Muscat Ottonel es sensible al mildiu y a la podredumbre gris.


Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*