

Négret de Banhars N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Négret de Banhars es originario de Aveyron. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Fer y el Manseng noir.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Négret de Banhars

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Négret de Banhars está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o pentagonales, enteras o de tres lóbulos, un seno peciolar poco abierto en V o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con hinchazón marcada, ondulado entre los nervios, en ocasiones ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2008	2018
ha	1	0.7

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	239	182	194	252	240	227	239
Allele 2	149	238	249	186	200	252	248	233	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Négret de Banhars es una variedad bastante vigorosa y con porte semi-erguido. Sus pámpanos son frágiles frente al viento. Los pedúnculos de los racimos son muy cortos lo que hace que las vendimias manuales resulten muy delicadas.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Négret de Banhars lleva el número 1374.


En 2005, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una veintena de clones en Aveyron.

Fenología


Época de desborre: 10 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*