

Négrette N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria del sudoeste de Francia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Négrette

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Négrette está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares, de color verde oscuro, enteras o de cinco lóbulos, con un seno peciolar de bordes paralelos y un punto de partida de los nervios secundarios cercano al peciolo, dientes cortos de lados convexos, un limbo plano, brillante, con hinchazón, con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o muy ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1523	1733	1125	1167	1250	1487	1096

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	240	238	233	239
Allele 2	131	236	262	182	202	260	238	243	251

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad de desborre tardío posee un vigor adecuado y se muestra lo suficientemente fértil en poda corta. No obstante, su sensibilidad a la corredura o al millerandaje puede provocar fluctuaciones en la producción. El pedúnculo de los racimos es corto. La Négrette produce buenos resultados en «boulbènes» (suelos silíceos finos), terrenos con grava e incluso arenosos.

Selección clonal en Francia


Los cinco clones autorizados de Négrette llevan los números 456, 580, 581, 582 y 663. El conservatorio instalado en 1997 en los viñedos de Fronton (Alto Garona) incluye 190 clones. Un otro conservatorio de unos cincuenta clones fue implantado en el departamento de Vendée en 2012.

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas a 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas son pequeñas a medianas. Esta variedad permite elaborar unos vinos agradables, muy aromáticos, ricos en antocianinas. Generalmente poco tánicos y poco ácidos, estos vinos carecen de vivacidad y brillo. Su aptitud para el envejecimiento es limitada y es preferible consumirlos jóvenes. La Négrette permite también elaborar unos vinos rosados equilibrados.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Négrette es muy sensible a la podredumbre gris, al oídio, así como también a los cicadélidos y a los ácaros.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*