

# Noir Fleurien N

### Variedad de uva de vino.



### Origen

Esta variedad originaria de Auvernia es, según los análisis genéticos publicados, probablemente una descendiente del Gouais blanc.

### Usar

Variedad de uva de vino.

### Nombre de la variedad en Francia

Noir Fleurien

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Noir Fleurien está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a los pámpanos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares o pentagonales, de cinco lóbulos, con senos laterales superiores profundos, un seno peciolar de bordes paralelos o lóbulos superpuestos, dientes medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el haz, plisado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

## Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|
| ha  | 6    | 0.2  | 0.1  |

# Perfil genético

| Microsatell | iteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|-------------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1    | 131     | 223   | 239   | 178    | 188     | 238     | 238    | 227    | 263    |
| Allele 2    | 141     | 238   | 255   | 191    | 204     | 252     | 254    | 259    | 271    |

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Noir Fleurien es una variedad de porte erguido, vigorosa, adaptada a los terrenos bastante secos y calcáreos.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad. En 2000, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una treintena de clones en los viñedos de Auvernia (Macizo central).

### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas pequeñas. El Noir Fleurien permite elaborar unos vinos con buen color, equilibrados y agradables.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Noir Fleurien no parece presentar sensibilidad particular a las enfermedades.

### Fenología


Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier