

Abondant B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad cultivada en el este de Francia ha sido obtenida por A. Wanner. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre la Madeleine royale y el Kövidinka.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Abondant

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Abondant está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a los pámpanos con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas de gran tamaño, enteras con un seno peciolar poco abierto de bordes paralelos o lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos respecto a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo ligeramente abultado, plisado cerca del peciolo, con hinchazón y, en el envés del limbo, una baja densidad de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2018
ha	21	14	3	2	0.8

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	247	178	194	246	248	216	251
Allele 2	149	238	249	184	194	252	254	247	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Abondant es una variedad vigorosa, fértil en poda corta. Su desborre precoz la expone a las heladas de primavera.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Abondant lleva el número 1376.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de medianas a grandes. El Abondant produce unos vinos blancos bastante neutros y ordinarios.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Abondant es sensible a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 3 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier