

Arrouya N

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria de Pirineos Atlánticos.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Arrouya

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Arrouya está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, enteras o de tres lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar abierto, dientes cortos o medios, de lados rectilíneos o convexos, un limbo plano ligeramente ondulado y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2018
ha	1	109	80	0.2

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	243	182	188	246	240	235	271
Allele 2	149	234	247	186	204	246	254	243	271

Potencial tecnológico

con un ligero amargor.

(racimos compactos).

Los racimos son medianos y compactos, mientras que

las bayas son pequeñas a muy pequeñas. El Arrouya

ácidos, sin color, pero astringentes y, en ocasiones,

El Arrouya es un poco sensible a la podredumbre gris

permite elaborar unos vinos comunes, bastante

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Cultivo y habilidades agronómicas

El Arrouya es una variedad con un vigor óptimo, poco fértil en poda corta, pero que en poda larga se vuelve bastante productiva. Por su carácter tardío, debe plantarse en zonas cálidas.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Arrouya lleva el número 1112.


Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.


Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media a 5 semanas después de la variedad Chasselas.

renologia

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier