

Orbois B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es, según los análisis genéticos publicados, probablemente una descendiente del Gouais blanc. Parece ser originaria del Valle del Loira y, más concretamente, de Touraine o Loir-et-Cher.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Orbois

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Orbois está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas, con una densidad elevada a muy elevada de pelos tumbados
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- las hojas adultas pequeñas, enteras o con senos laterales poco profundos, un seno peciolar en V o en lira poco abierto o cerrado, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antociánica intensa de los nervios, un limbo con hinchazón, ondulado entre los nervios y con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1282	1455	1145	754	435	270	149

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	229	239	176	188	238	248	227	271
Allele 2	149	238	243	186	196	246	252	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad de vigor moderado presenta una fertilidad óptima.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Orbois Ilevan los números 205, 206 y 504. En 2007, se creó un conservatorio de unos cincuenta clones en Loir y Cher.

Fenología

Época de desborre: 3 días antes de la variedad Chasselas. Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son pequeñas. El potencial de acumulación de azúcares en las bayas de esta variedad es relativamente elevado, con una acidez bastante baja. Se utiliza principalmente para la elaboración de vinos de base en ensamblaje con otras variedades.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

A pesar de sus racimos muy compactos, el Orbois no se muestra demasiado sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier