

Perdin B

Variedad ornamental para aficionados.



Origen

Esta variedad se obtuvo en 1981 por el INRA. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el 7489 INRA y la Perle de Csaba.

Usar

Variedad ornamental para aficionados.

Nombre de la variedad en Francia

Perdin

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Perdin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas o rojizas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos superpuestos, con fondo en U y frecuentemente limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes cortos a medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica baja o media de los nervios, un limbo con hinchazón moderada, alabeado o con bordes hacia el haz, en ocasiones abultado u ondulado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y una densidad baja a media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta, con un sabor a moscatel o aromático.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

1

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	247	176	202	256	240	245	271
Allele 2	143	234	260	186	204	262	240	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Perdin posee un vigor medio. Es una variedad con un porte semi-erguido u horizontal que debe ser empalizada y que puede manejarse en poda corta o en poda larga. El Perdin es un poco sensible al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Perdin lleva el número 5003.

Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Perdin son medianos. Las bayas también son medianas, jugosas, con piel poco gruesa.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Perdin es poco sensible al mildiu, al oídio, al black rot y a la podredumbre gris, pero debe injertarse. A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*