

Persan N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad la encontramos en Saboya e Isère.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Persan

Sinonimia

En Italia, el Persan es oficialmente denominado "Becuet". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Persan está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el [registro de Italia](#).

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas de gran tamaño, de color verde oscuro, orbiculares a reniformes, de cinco lóbulos con un seno peciolar abierto, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, en ocasiones abultado, y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica larga.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	201	179	18	8	3	6	20
----	-----	-----	----	---	---	---	----

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	225	239	182	188	240	248	233	239
Allele 2	149	236	257	186	194	252	262	233	251

Cultivo y habilidades agronómicas

El Persan es una variedad vigorosa manejada generalmente en poda larga, colocada en tutores y cultivada en cepas de gran desarrollo. Ofrece buenos resultados en cantizales calcáreos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Persan lleva el número 1110. En 1999, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una quincena de clones en los viñedos de Saboya.

Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Persan produce vinos tánicos, aptos para el envejecimiento y con buena acidez.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Persan es bastante sensible al mildiu y al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, por el nombre de "Becuet", [[página web](#), consultada en 2020].



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*