

Arrufiac B

Variedad de uva de vino.



Origen

El Arrufiac es una variedad autóctona del sudoeste (valle del Adour).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Arrufiac

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Arrufiat" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Arrufiac está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes verdes con zonas ligeramente bronceadas,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color rojo o con estrías rojas,
- a las hojas adultas con senos laterales profundos con la base en U con un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar con la base frecuentemente limitada por el nervio cerca del peciolo, una pigmentación antociánica elevada de los nervios y de los peciolos, un limbo con hinchazón y ondulado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a los racimos de forma cónica, un poco compactos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente ovoides.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1988	2000	2008	2018
ha	271	178	99	119	93	31

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	176	200	256	240	233	239
Allele 2	141	229	262	178	204	260	254	233	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad posee un vigor óptimo. Su fertilidad suele ser buena en general, pero también puede ser irregular. En ocasiones, presenta sensibilidad al millerandaje.


Selección clonal en Francia

Los cinco clones autorizados de Arrufiac llevan los números 405, 652, 653, 921 y 922. En 1996 y 1997, se plantaron dos conservatorios en Gers y Altos Pirineos; garantizan la conservación de 150 clones aproximadamente.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas pequeñas con piel gruesa. Esta variedad posee un potencial cualitativo interesante, en especial, a nivel de los aromas y su tipicidad.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Arrufiac es bastante sensible al mildiu y al black rot.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*