

Petit Meslier B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad originaria del norte de Francia sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce de un plantón de Gouais blanc y Savagnin.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Petit Meslier

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Petit Meslier está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas pequeñas, orbiculares, de cinco lóbulos, con senos laterales abiertos, con forma de la base en U, un seno peciolar poco abierto o de bordes paralelos, dientes cortos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo mate, con hinchazón, plisado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2018
ha	46	19	17	1	16

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	249	176	194	238	238	235	271
Allele 2	149	236	257	186	204	252	248	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Petit Meslier es una variedad de vigor moderado, precoz en lo que respecta al desborre, lo que la expone a las heladas de primavera. Esta variedad se muestra sensible al millerandaje y a la corredura. Es preferible utilizar la poda larga y plantar esta variedad en terrenos favorables y bien expuestos.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Petit Meslier llevan los números 1088 y 1195. En 2003, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de 36 clones en Champaña.

Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Petit Meslier posee un buen potencial de acumulación de azúcares en las bayas. Su rendimiento en mosto es bajo. Permite elaborar vinos blancos secos o vinos de base para espumosos, que son de buena calidad, refinados, vivos y que presentan una tipicidad aromática interesante.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Petit Meslier es muy sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*