

Picardan B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria del sur de Francia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Picardan

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Araignan" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Picardan está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes o con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas cuneiformes o pentagonales, de tres lóbulos, con un seno peciolar cerrado con lóbulos ligeramente superpuestos, dientes grandes, de largo medio en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con hinchazón leve, ocasionalmente abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1988	2018
ha	60	10	2.9

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	196	238	248	233	239
Allele 2	135	238	249	188	204	252	254	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Picardan es una variedad de vigor moderado con un porte semi-erguido, que debe manejarse en poda corta y ser empalizada, cuando sea posible. Esta variedad sensible a la carencia de magnesio se adapta bien a las zonas cálidas y a los terrenos secos y poco fértiles.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Picardan lleva el número 1183.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Picardan permite elaborar vinos afrutados, bastante refinados, con una acidez moderada. El potencial en azúcares de esta variedad es bajo a medio.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Picardan es sensible al oídio y un poco sensible a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier