

Pinot blanc B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación blanca del Pinot noir.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Pinot blanc

Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Pinot noir, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es verde-amarillo. Además, las hojas adultas del Pinot blanc suelen ser menos recortadas que las de las variedades Pinot gris y Pinot noir.

Sinonimia

En la Unión Europea, el Pinot blanc es oficialmente denominado con otros nombres: Beli pinot (Eslovenia), Pinot Bianco (Italia, Malta), Rulandské biele (Eslovaquia) y Weisser Burgunder (Alemania, Austria). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Pinot blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	610	812	1491	1565	1503	1262	1280

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	225	239	182	188	240	238	216	239
Allele 2	149	236	243	186	194	246	248	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Pinot blanc es una variedad bastante vigorosa y con una producción regular (más productiva que el Pinot gris o el Pinot noir). Un poco sensible a la clorosis, se adapta bien a suelos profundos, bastante cálidos, pedregosos o no. El Pinot blanc también presenta buena resistencia al frío.

Selección clonal en Francia

Los cinco clones autorizados de Pinot blanc llevan los números 54, 55, 1294, 1295 y 1296. En 1984, se llevó a cabo en Alsacia la instalación de una colección-conservatorio con unos 200 clones. Otros dos conservatorios se han establecido: uno en Champaña, que comprende 24 clones, y otro en Cote d'Or en 1993, que comprende 14 clones.

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas son de pequeño tamaño. El Pinot blanc permite elaborar vinos agradables, ligeramente robustos y con una acidez media. También se puede utilizar para la elaboración de vinos de base para espumosos.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


Esta variedad es bastante delicada pues es relativamente sensible a las principales enfermedades.

Fenología


Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier