# Attiki N

## Variedad de uva de mesa.







**Origen**

Esta variedad fue obtenida por Vassilis Mikos (Grecia). Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Alphonse Lavallée y el Black Monukka.

**Usar**

Variedad de uva de mesa.

**Nombre de la variedad en Francia**

Attiki

**Sinonimia**

En Austria, el Attiki es oficialmente denominado "Attica". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

**Datos regulatorios**

En Francia, el Attiki está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Austria.

---

**Elementos de descripción**

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas o rojizas,
- a las hojas adultas orbiculares o pentagonales, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar con fondo en V, poco abierto o cerrado, dientes medianos de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y un lado convexo, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo con hinchazón moderada, ondulado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma tronco-ovoide con ombligo ligeramente deprimido.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| | |
|---|---|
| **Año** | 2018 |
| **ha** | 0 |

# Perfil genético

| **Microsatellite** | **VVS2** | **VVMD5** | **VVMD7** | **VVMD27** | **VRZAG62** | **VRZAG79** | **VVMD25** | **VVMD28** | **VVMD32** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allele 1 | 133 | 236 | 253 | 182 | 188 | 252 | 248 | 243 | 255 |
| Allele 2 | 149 | 238 | 255 | 191 | 204 | 258 | 254 | 243 | 271 |

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Attiki es una variedad de vigor elevado con un porte semi-erguido u horizontal. Debe ser empalizado y manejarse en poda larga.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 8 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana a 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

### Potencial tecnológico

Los racimos del Attiki son grandes, poco compactos y las bayas son medianas. La piel es de grosor medio y la pulpa es firme. Las bayas del Attiki son generalmente apirenas. Cuando las pepitas están presentes, son blandas y muy poco perceptibles. Esta variedad de sabor simple presenta, sin embargo, unas cualidades gustativas interesantes.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Attiki es poco sensible a la podredumbre gris.

### Referencias bibliográficas


- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,*
*plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®*
*INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados