

# Plant droit N

Variedad de uva de vino.







# Origen

Esta variedad parece ser originaria del alto valle del Durance.

#### Usar

Variedad de uva de vino.

#### Nombre de la variedad en Francia

Plant droit

#### Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Espanenc" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Plant droit está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Chipre.

# Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos con un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	172	337	192	171	33	20	8

# Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	223	233	182	200	252	248	247	239
Allele 2	149	234	249	191	204	258	262	257	251

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad de porte erguido se adapta bien al manejo en gobelet. Es bastante productiva y fértil. Es resistente a la sequía y se muestra poco sensible al pardeado.

#### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Plant droit lleva el número 1173. Recientemente, se han llevado a cabo prospecciones en los viñedos de la Provenza.

#### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son mediados a grandes. El Plant droit produce unos vinos de grado alcohólico bastante bajo y de color deficiente.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Plant droit es muy sensible a la podredumbre gris.

### Fenología


Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

## Debourrement



#### Maturité



# Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier