

# Poulsard N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Es una variedad autóctona de los viñedos del Jura. Según los análisis genéticos publicados, el Poulsard sería directamente emparentado con la Rèze.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Poulsard

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Ploussard" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Poulsard está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- al pámpano con zarcillos largos a muy largo,
- a las hojas adultas, de cinco o siete lóbulos con senos laterales profundos con fondo en U, un seno peciolar en U abierto, dientes medianos de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja o muy baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	314	279	292	297	308	311	257

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	233	176	194	248	238	216	239
Allele 2	135	236	247	186	196	256	240	243	261

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Poulsard es una variedad bastante delicada, sensible a las heladas de primavera, a la corredura y a los golpes de sol. Debe manejarse en poda larga y ser empalizada. El Poulsard se adapta bien a los suelos con predominio de marga o arcilla.

### Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños, mientras que las bayas son medianas a grandes. El Poulsard produce vinos de gran finura, aromáticos pero poco vigorosos, de color variable que, en ocasiones, adopta un tono «piel de cebolla».

### Selección clonal en Francia

Los cuatro clones autorizados de Poulsard llevan los números 464, 584, 1047 y 1231. En 2005 se implantó en el Jura un conservatorio de 14 clones.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


Esta variedad es especialmente sensible al oídio.

### Fenología


Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*