


Précoce Bousquet B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad, seleccionada por M. Bousquet en Tarn, se corresponde con la variedad tradicional húngara Honigler.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Précoce Bousquet

Sinonimia

En la Unión Europea, el Précoce Bousquet es oficialmente denominado con otros nombres: Bela (Eslovenia) y Honigler (Hungría). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Précoce Bousquet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Hungría y Eslovenia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas orbiculares de tres o cinco lóbulos con senos laterales cerrados con lóbulos ligeramente superpuestos y con forma de la base en U, un seno peciolar con base en U, dientes medianos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	33	35	23	24	12	8	2.8
----	----	----	----	----	----	---	-----

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	141	223	243	178	188	252	240	247	247
Allele 2	143	229	247	191	204	260	254	259	251

Cultivo y habilidades agronómicas

La fertilidad del Précoce Bousquet es mediana. Se recomienda la poda larga.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, media semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano. El Précoce Bousquet produce unos vinos bastante cálidos, pero neutros.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Précoce Bousquet es sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*