

Aubin B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad originaria del noreste de Francia (Lorena) sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Savagnin.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Aubin

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Aubin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas de tres lóbulos, con senos laterales abiertos, con base en U, un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes cortos respecto a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica elevada de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés, abultado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 2018 |
|-----|------|------|
| | | |
| ha | 3 | 1.2 |

Perfil genético

| Microsatell | iteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|-------------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 141 | 232 | 249 | 176 | 194 | 238 | 248 | 227 | 271 |
| Allele 2 | 149 | 236 | 257 | 186 | 204 | 246 | 254 | 233 | 271 |

Potencial tecnológico

las enfermedades.

aromáticos y medianamente ácidos.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Los racimos son medianos y las bayas son pequeñas.

El Aubin produce unos vinos de calidad media, poco

El Aubin no parece presentar sensibilidad particular a

Cultivo y habilidades agronómicas

El Aubin es una variedad poco vigorosa, precoz y de fertilidad media. Debe plantarse en zonas de baja exposición al riesgo de heladas de primavera pues su desborre es muy precoz.

Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Aubin lleva el número 1262.

Fenología


Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier