

Aubin vert B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad originaria del noreste de Francia (Lorena) sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Pinot.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Aubin vert

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Aubin vert está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas de tres lóbulos con un seno peciolar en V o con bordes paralelos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo ligeramente ondulado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ovoide.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2018
ha	0

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	239	176	188	238	248	227	239
Allele 2	149	232	243	186	196	246	254	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Aubin vert es una cepa bastante fértil y productiva que debemos podar con moderación.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado para esta variedad. Recientemente, se han llevado a cabo unas prospecciones en los viñedos del noreste.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El Aubin vert produce unos vinos comunes, poco alcohólicos y relativamente ácidos.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Aubin vert no parece presentar sensibilidad particular a las enfermedades.

Fenología


Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media a 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia. ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier