

Rivairenc N

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria de Languedoc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Rivairenc

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Aspiran noir" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Rivairenc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados, con presencia de pigmentación antociánica intensa,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar poco abierto, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo o un lado convexo, una pigmentación antociánica mediana a intensa de los nervios, un limbo con hinchazón leve, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1988	2018
ha	99	23	7	7

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	176	204	252	240	227	239
Allele 2	131	223	249	178	204	260	248	257	261

Cultivo y habilidades agronómicas

El Rivairenc es una variedad de vigor moderado con un porte bastante erguido, que debe podarse en corto. Esta variedad se adapta bien a las zonas cálidas y a los terrenos secos y poco fértiles. Además, el Rivairenc es sensible a las heladas de invierno.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Rivairenc lleva el número 1152.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes a muy grandes. El Rivairenc permite elaborar unos vinos bastante ligeros y de color deficiente. El potencial en azúcares de esta variedad es bastante reducido.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Rivairenc es poco sensible a la podredumbre gris. Por el contrario, es más sensible al oídio y al mildiu.

Fenología


Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier