

Romorantin B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad parece ser originaria del centro de Francia y sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Pinot teinturier y el Gouais blanc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Romorantin

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Danery" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Romorantin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo-violáceo,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar abierto en V, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón gruesa, abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada y ligeramente achatada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	680	581	271	156	231	74	79

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	126	232	243	176	188	238	238	227	249
Allele 2	131	236	249	186	204	246	248	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es bastante fértil, productiva y con un porte erguido. Se puede manejar en poda larga o corta. Debe plantarse en terrenos adaptados y precoces.

Selección clonal en Francia

Los cuatro clones autorizados de Romorantin llevan los números 466, 873, 928 y 929. En 2007, se creó un conservatorio de unos cincuenta clones en Loir y Cher.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes, mientras que las bayas son pequeñas. El Romorantin permite elaborar unos vinos bastante refinados, afrutados y agradables.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Romorantin es moderadamente sensible a la podredumbre gris y a las polillas del racimo.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*