

# Romorantin B

### Variedad de uva de vino.







### Origen

Esta variedad parece ser originaria del centro de Francia y sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Pinot teinturier y el Gouais blanc.

#### Usar

Variedad de uva de vino.

### Nombre de la variedad en Francia

Romorantin

#### Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Danery" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Romorantin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo-violáceo,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar abierto en V, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón gruesa, abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada y ligeramente achatada.

## Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	680	581	271	156	231	74	79

## Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	126	232	243	176	188	238	238	227	249
Allele 2	131	236	249	186	204	246	248	235	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es bastante fértil, productiva y con un porte erguido. Se puede manejar en poda larga o corta. Debe plantarse en terrenos adaptados y precoces.

### Selección clonal en Francia

Los cuatro clones autorizados de Romorantin Ilevan los números 466, 873, 928 y 929. En 2007, se creó un conservatorio de unos cincuenta clones en Loir y Cher.

### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes, mientras que las bayas son pequeñas. El Romorantin permite elaborar unos vinos bastante refinados, afrutados y agradables.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Romorantin es moderadamente sensible a la podredumbre gris y a las polillas del racimo.

### Fenología


Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier