

Roublot B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad originaria de Yonne sería el resultado, según los análisis genéticos publicados, de un cruce entre el Pinot y el Gouais blanc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Roublot

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Roublot está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de cinco o siete lóbulos (lóbulo central recortado), con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos a largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo alabeado, con bordes hacia el envés, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	178	194	240	238	216	249
Allele 2	135	238	239	182	196	244	238	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Roublot tiene un porte semi-erguido. Su fertilidad es buena aunque irregular, por eso debe manejarse en poda larga.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Roublot lleva el número 1409.

Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Roublot permite elaborar vinos blancos, de color sostenido (amarillo), pero bastante finos y que presentan una cierta tipicidad aromática.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Roublot se muestra sensible al oídio y a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*