


# Saint-Côme B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad autóctona de Aveyron, según los análisis genéticos publicados, es probablemente una descendiente del Gouais blanc y del Moural.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Saint-Côme

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Saint-Côme está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con una pigmentación antocianica elevada,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos con senos laterales con fondo redondeado, un seno peciolar poco abierto en V o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con hinchazón gruesa, con bordes ligeramente hacia el envés y abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados y una densidad elevada de pelos erguidos en los nervios,
- a las bayas de forma redondeada con pruina importante.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

3.3

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	247	172	204	238	238	227	239
Allele 2	137	238	249	176	204	248	238	243	249

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Saint-Côme es una variedad poco fértil que parece más adaptada a una poda larga.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Saint-Côme lleva el número 1298. Un conservatorio de 3 clones fue plantado en Aveyron en 2005.

### Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas son medianas. El potencial de azúcares del Saint-Côme es bueno; esta variedad permite elaborar unos vinos blancos de acidez elevada.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Debido a la gran compacidad de sus racimos, el Saint-Côme es un poco sensible a la podredumbre gris. No parece presentar sensibilidad particular a las demás enfermedades criptogámicas.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*